



Ordoval®

Des qualités retrouvées
au contact des fruits

• Cultures spéciales •
Nutrition et protection

FONGICIDE ARBO - MARAICHAGE - VIGNE



La sécurité d'un grand nom



Ordoval® : l'efficacité confirmée du thirame

Ordoval® est un fongicide contenant 80% de thirame. Le thirame (ou TMTD) est un diméthyl - bis - dithiocarbamate différent des EBDC's (éthylène - bis - dithiocarbamate). Ordoval® est un fongicide à action de contact qui agit préventivement sur un grand nombre de champignons pathogènes des arbres fruitiers, des cultures légumières, des fraisiers et de la vigne.

Sur fruits à pépins et sur fruits à noyaux, cette polyvalence permet de contrôler les maladies majeures (cloque du pêcher, tavelure du pommier...) et des maladies dites secondaires (Coryneum, maladie de la suie et des crottes de mouches, etc.).

Ces qualités en font un des piliers des programmes de gestion de la résistance dans lesquels sont intégrées d'autres matières actives.

Son homologation et son utilisation dans de nombreux pays facilitent la commercialisation à l'export des denrées protégées par Ordoval®.

® Marque déposée Compo.

Une formulation techniquement avancée

Ordoval® est formulé en granulés dispersibles (WG) selon le procédé Granuflo®.

Ordoval® présente de nombreux avantages :

- Pas de poussière → limite les irritations
- Facile à doser
- Pas de résidus dans les emballages
- Insensible aux variations de température


® Granuflo® est une marque déposée par TAMINCO® N.V.



Ordoval® : une remarquable action de contact




Ordoval® :
référence contre la cloque du pêcher



Sur cloque du pêcher, 3 applications d'Ordoval® peuvent contrôler de fortes infections qui se développent principalement au cours des printemps pluvieux et sur des variétés dont le débourrement est précoce.



Ordoval® :
très grande efficacité sur tavelure du pommier



Sur tavelure du pommier, Ordoval® a prouvé son efficacité par rapport aux meilleures références à action de contact, aussi bien seul en début de programme, qu'en alternance dans un programme incluant des strobilurines ou des triazoles ou même en protection avant récolte.

Ordoval® : point fort de tous les programmes

Ordoval® est un acteur majeur dans les programmes de protection fongicides.

Sur pommier, grâce à son action principale sur tavelure, Ordoval® s'est montré un excellent partenaire de l'Alliage®, dans des situations où les strobilurines manifestaient une baisse d'efficacité.

Ordoval® : point fort anti-résistances

A ce jour, aucun phénomène de résistance n'a été détecté sur les maladies contrôlées régulièrement par Ordoval®.

L'effet de contact du thirame confère à cette molécule une efficacité dans le temps.

Ordoval® : sélectif et respectueux

Ordoval® présente une grande sélectivité vis-à-vis de nombreuses cultures.


Sur le russeting des pommes, Ordoval® aurait tendance à en limiter les effets.

Ordoval® est sans effet sur la plupart des insectes auxiliaires, il s'est montré neutre sur *Typhlodromus pyri* après 4 applications successives.



Positionnement sur pêcher

Fruits à noyaux : cloque et autres maladies






Stades	A	C	DE	G	HI	Mai	Juin	Récolte	Octobre
	Bourgeon d'hiver	Calice visible	Corolle et étamines visibles	Chute des pétales			Fruit		Chute des feuilles
Maladies		Cloque	Cloque		Oïdium		Monilia Coryneum		Cloque Coryneum
Traitements		Ordoval® (2 à 3 traitements) (1)							Ordoval® (2)
(1) Arrêt en mai	←								
(2) Si forte pression maladie					Alliage® (2 traitements)				

Ordoval® est la base de la protection contre la cloque et complète le spectre des fongicides appliqués contre l'oïdium et les monilioses. Dans les situations à forte pression (maladie mal contrôlée au printemps précédent), Ordoval® peut être appliqué à l'automne.

Positionnement sur pommier

Fruits à pépins : tavelure et autres maladies



Stades	C-C3	D	E	F	G	H	J	Mai	Juin	Août
Maladies				Tavelure et Oïdium						Suie et crotte de mouche
Traitements	Ordoval® (seul ou associé à Sari® TF)					Ordoval®				
					Alliage® (2 à 3 traitements)					

Ordoval® protège les pommiers et les poiriers contre la tavelure dès le stade C3 et peut être appliqué sans aucune restriction jusqu'à la protection des fruits contre les maladies de la suie et des crottes de mouche.

Alliage® 50% de Kresoxim-méthyl. n° AMM 9600398. Sari® TF 400 g/L de pyriméthanol n° AMM : 9700396

Applications

- Ordoval® est un fongicide à action de contact.
- Ordoval® agit préventivement contre les maladies.
- Les applications d'Ordoval® doivent être renouvelées en cas de fortes pluies (25 mm - maximum 24 h après lessivage).

Caractéristiques

Composition : 80 % de thirame.

Formulation : granulés dispersibles dans l'eau (WG).

N° AMM : 8500023.

Détenteur de l'AMM : Taminco® N.V. (Belgique).

Classement : Xn nocif. R22, R43, R48/22, R50/53

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Usages homologués

Cultures	Maladies	Doses	DAR (délai avant récolte en jours)	LMR (limite maximale de résidus en mg/kg/ exprimé en thirame)
Amandier	Cloque	0,250 kg/hL	150	0,1
	Tavelure	0,250 kg/hL	150	0,1
Fraisier	Anthraxose (<i>Colletotrichum</i>)	3,00 kg/ha	7	10
	Pourriture grise (<i>Botrytis</i>)	3,00 kg/ha	7	10
Laitue	Pourriture du collet	0,250 kg/hL	Stade 18 maxi	2
Pêcher	Cloque	0,250 kg/hL	42	3
	Maladie criblée (<i>Coryneum</i>)	0,250 kg/hL	42	3
	Tavelure	0,250 kg/hL	42	3
Poirier	Maladie de la suie	0,250 kg/hL	35	5
	Maladie des crottes de mouche	0,250 kg/hL	35	5
	Septoriose	0,250 kg/hL	35	5
	Tavelure	0,250 kg/hL	35	5
Pommier	Maladie de la suie	0,250 kg/hL	35	5
	Maladie des crottes de mouche	0,250 kg/hL	35	5
	Tavelure	0,250 kg/hL	35	5
Vigne	Pourriture grise	4,00 kg/ha	35	3

Informations valables depuis le 17 janvier 2008.

Délai de ré-entrée : 48 heures

Zone de non-traitement : 5 mètres

Conditionnement

Boîte carton de 5 kg avec bec verseur.

Groupage en 4 x 5 cartons

Palette de 800 kg

