



Pack Protection Tavelure **Sari[®] TF & Ordoval[®]**

**Pack associatif de 2 fongicides à modes d'action différents
destiné à lutter contre la tavelure du pommier en**

- limitant l'apparition de phénomènes de résistance
- développant une synergie au niveau de l'efficacité
- bénéficiant des effets secondaires propres à chacun des 2 produits

● **Cultures spéciales** ●

Nutrition et protection

FONGICIDES



La sécurité d'un grand nom

Pack Protection Tavelure : Sari® TF & Ordoval®

Les avantages du Pack Protection Tavelure

Les conditions favorables au développement de la tavelure du pommier sont en progression : variétés sensibles, conditions climatiques humides et chaudes...

A contrario, le nombre de familles chimiques fongicides pour lutter contre la tavelure se restreint : disparition de certains produits, phénomène de résistance, limitation du nombre d'applications pour certaines matières actives.

Soucieux de pérenniser les familles chimiques, COMPO, BASF et Taminco ont décidé d'associer les 2 matières actives du Sari TF et de l'Ordoval :

- Absence de résistance croisée entre les 2 familles fongicides
- Contrôle des souches moins sensibles aux ANP (anilinopyrimidine)


De plus, à pleine dose de chacun des produits, une synergie a pu être mise en évidence sur la tavelure et un certain nombre d'effets secondaires positifs ont pu être notés.



Une synergie confirmée...


Sur feuilles...

Efficacité sur % de feuilles tavelées



...et sur fruits

% de fruits indemnes de tavelure



Moyennes de 2 essais 2007 sur pommier avec 9 applications entre les stades F et J à cadence de 7 jours

Conditions d'application

L'utilisation du pack protection tavelure Sari TF & Ordoval permet de bénéficier de son action curative (72 heures après le début de l'événement contaminant) et de son action préventive (7 jours).

En fonction de la pression de la maladie et des conditions climatiques, les cadences d'application seront de 7- 8 jours, cadences qui seront réduites de 1 à 2 jours si les conditions sont très favorables au développement de la maladie, propices au lessivage des produits et à la croissance des pousses.

Les fongicides seront appliqués des stades C-C3 jusqu'au stade G (chute des premiers pétales).

L'utilisation du pack permet également de prolonger le stade limite d'application, les très jeunes fruits seront protégés.

Les applications se feront de préférence sur feuillage sec.

Sari® TF

- 400 g / l de pyriméthanol
- Suspension concentrée (SC)
- AMM N° 9700396
- Usage et dose autorisés :
Tavelure du pommier : **0,05 l/hl** (jusqu'au stade chute des premiers pétales)

• Marque déposée, homologation et fabrication :
BASF Agro
21, chemin de la Sauvegarde
69134 ECULLY Cedex



Caractéristiques du pack protection tavelure Sari® TF & Ordoval®

- Usage autorisé : pommier Tavelure, maladie de la suie, maladie des crottes de mouche
- ZNT : 50 mètres / DAR : 28 jours / délai de rentrée : 48 h
- LMR : 0,3 mg/kg pour le pyriméthanol
3 mg/kg pour le thirame



Pack de : **3 x 5 kg Ordoval - 3 x 1 litre Sari TF**
1 broc doseur
Palette de : **40 packs**

Ordoval®

- 80% de thirame
- Granulé dispersable dans l'eau (WG)
- AMM N° 8500025
- Usage et dose autorisés sur pommier :
Tavelure, maladies des crottes de mouche, maladie de la suie : **0,250 kg/hl**
- Autres maladies et cultures autorisés : voir étiquette



• Marque déposée
COMPO
• Homologation et fabrication :
Taminco NV Belgique

